



ANUNȚ DEZINSECȚIE ATENȚIE



ÎN PERIOADA DE 21.08.2026 – 24.08.2026 , S.C. NID CLEANING S.R.L. VA EFECTUA TRATAMENTUL NR. 1 DE DEZINSECȚIE EXTERIOARĂ ÎMPOTRIVA ȚÂNȚARILOR ADULȚI ȘI A CĂPUȘELOR PE TOATĂ SUPRAFAȚA ORAȘULUI ȚÂNDĂREI, ÎN INTERVALUL ORAR 09:00 – 14:00 respectiv 22:00 – 05:00

SUBSTANȚA UTILIZATĂ DEZINSECȚIE ȚÂNȚAR ADULT

SOLFAC TRIO EC 140 NF

FORMULARE ȘI CONDIȚIONARE :

- Insecticid lichid concentrat emulsionabil de culoare gălbuie
- Substanțele active sunt : Cipermitrin 5%, Pralletrin 1%, Piperonil Butoxide 8% - Aria de utilizare: interior și exterior.
- Concentrație : 0,4 - 0,8 %
- Se va aplica atât prin pulverizare în sistem ULV(ultra low volume), dar și prin ceață caldă.

SUBSTANȚA UTILIZATĂ LARVICIDARE

VECTOBAC WG

FORMULARE ȘI CONDIȚIONARE :

- Larvicid biologic
- Substanța activă: **374 g/kg *Bacillus thuringiensis israelensis*** - Se va aplica prin pulverizare.

MĂSURI DE PROTECȚIE PENTRU PUBLIC

Produsele insecticide utilizate pentru combaterea țânțarilor adulți și a căpușelor, nu sunt toxice pentru oameni și animale, fiind avizate de Ministerul Sănătății, prin Comisia Națională pentru Produse Biocode, dar recomandăm persoanele sensibile, asmatiche, cardiace sau cu afecțiuni ale căilor respiratorii, să își ia toate măsurile de protecție împotriva intoxicărilor accidentale, dar și să evite autoutilitara și operatorii care aplică tratamentul. Pentru persoanele care locuiesc la o distanță mai mică de 20 metri de aliniamentul stradal, recomandăm închiderea ferestrelor.

DESCRIEREA MĂSURILOR DE PRIM AJUTOR

INDICAȚII GENERALE :

- Se va ieși din zona periculoasă.
- Așezați și transportați victima într-o poziție laterală stabilă.
- Scoateți imediat hainele contaminate și depozitați-le în siguranță.

INHALARE :

- Se va ieși la aer curat.
- Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură.
- Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

CONTACTUL CU PIELEA:

- Se va spăla imediat cu apă și săpun.
- Dacă simptomele persistă se vachema un medic.

CONTACTUL CU OCHII :

- Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timpde cel puțin 15 minute.
- Scoateți lentilele de contact, dacă există, dupăprimele 5 minute și continuați sa clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

INGERARE :

- NU se va induce stare de vomă. Se va clăti gura. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

In funcție de condițiile meteorologice , perioada se poate modifica. Vă mulțumim pentru înțelegere !